Hémorragie

(Saignement fort qui ne s'arrête pas)

- ◆ **Comprimer la plaie** (avec protection si possible)
- ◆ **Allonger**
- ◆ **Alerter**

(**Pansement compressif** aux membres si besoin de se libérer pour alerter)

Saignement de nez : Tête penchée en avant - Moucher - Comprimer 2 narines 10 min (avis médical si pas d'arrêt).

Vomit ou crache du sang : Position de confort ou sur côté si inconscience - Récupérer sang - Alerter

Autre saignement anormal des orifices naturels : Allonger - Alerter

Obstruction des voies aériennes

Obstruction partielle (s'étouffe mais peut encore tousser ou parler): Faire tousser, Asseoir, Alerter

Obstruction totale (l'air ne passe plus du tout : pas de son, pas de toux)

◆ Chez l'adulte

1 à 5
claques

1 à 5 compressions abdominales
(ou thoraciques si obèse ou enceinte)

Arrêter et asseoir si respiration ou toux

- ◆ **Chez l'enfant** : comme adulte mais claques en position demi-penché sur le genou
Compressions abdominales

◆ Chez le nourrisson :

1 à 5 claques puis si besoin
1 à 5 compression thoraciques
avec 2 doigts au centre de la poitrine, à califourchon tête en bas

Alerte et Protection des Populations

Signal National d'Alerte

= Danger exceptionnel et imminent

3x
1min41s

S'informer (Radio NC1ère, TV NC1ère)

Se mettre à l'abri selon le danger

- ◆ Tsunami, barrage : **aller en hauteur**
 - ◆ Incendie, pollution chimique : **se confiner** ou évacuer selon les consignes
- Attendre **signal de fin d'alerte** (son continu 30s)

Protection

Danger incontrôlable pour le sauveteur :

délimiter la zone pour empêcher toute intrusion et passer l'alerte

Pas de danger pour le sauveteur :

Supprimer le danger pour la victime ou la dégager d'urgence et agir selon son état.

Passer une alerte

Téléphone fixe
Mobilis
Cabine
Borne

- N° **téléphone** ou de la borne
 - Nature du **problème** (maladie, accident...)
 - **Localisation** la plus précise
- Répondre aux questions
- Ne pas raccrocher avant instruction des secours

Prévention et Secours Civiques Niveau I

1 victime

1 sauveteur

Brûlures

(Brûlures de la peau, voies aériennes ou digestives par la chaleur, frottements ou radiations)

- ◆ Supprimer le danger
- ◆ **Refroidir à l'eau le plus tôt possible**

Brûlure grave

(main, visage, articulation, brûlure étendue)

- Alerter**
- Refroidir**
- Installer - Protéger - Surveiller**

Cloque(s) >

Brûlure simple

(surface < moitié paume de main)

- **Refroidir** jusqu'à fin douleur
- **Protéger** (pansement)
- Avis médical : enfant/bébé

Brûlures particulières :

- ◆ Brûlure électrique ou projection chimique : **Protéger - Arroser - Alerter**
- ◆ Brûlure ingestion chimique : **Alerter - Pas vomir - Pas boire**
- ◆ Brûlure par inhalation : **Installer allongé ou assis - Alerter**

Plaies

(Coupure, éraflure, morsure ou piqure de la peau)

Plaie grave

(plaie profonde, déchiquetée ou écrasée surtout si thorax, abdomen, visage)

Ne jamais retirer corps étranger

Allonger à plat dos horizontal

- Plaie Thorax : assis
- Plaie Abdomen : allongé, jambes pliées
- Plaie œil : allongé, immobile, yeux fermés

Alerter - Couvrir - Surveiller

Plaie simple

(coupure, éraflure de surface qui saigne peu)

- Nettoyer / **Désinfecter**
- **Pansement**
- Vérifier vaccination tétanos

Malaise

Se renseigner :

- Age
- Durée du malaise
- 1^{ère} fois
- Médicaments
- Hospitalisation, maladies

- ◆ **Mettre au repos** (allongé ou assis)
- ◆ **Se renseigner**
- ◆ Alerter

Traumatismes

(Causes : coup, chute, faux mouvement)

- ◆ **Ne pas bouger la victime**
- ◆ Alerter
- ◆ Protéger (couvrir)
- ◆ Surveiller

Perte de connaissance

Victime inconsciente qui respire

(Causes : traumatisme, problème médical ou toxique : alcool, drogues, médicaments ...)

- ◆ **Vérifier la conscience**
- ◆ **Libérer les voies aériennes** (basculer tête en arrière avec main au front et menton)
- ◆ **Vérifier respiration** 10 sec max
- ◆ Mise en **position latérale de sécurité (PLS)** Pour l'enfant et l'adulte :

Stabiliser (genou en angle)
Ouvrir la bouche
Vérifier respiration

Pour le nourrisson : PLS dans les bras, sur le côté, bouche ouverte vers le bas.

- ◆ **Alerter - Vérifier respiration - Couvrir**

Arrêt cardiaque

Victime inconsciente qui ne respire pas

(Causes : Maladie cardiaque ou après hémorragie, étouffement, intoxication, traumatisme)

Risque : Mort de la victime) **LA CHAÎNE DE SURVIE**

- ◆ **ALERTER** le + tôt possible
- Trouver **DEFIBRILLATEUR** le + vite si possible

- ◆ Commencer **réanimation cardio-pulmonaire (RCP)**

30 compressions thoraciques :

Comprimer fortement le sternum (5-6cm) - Rythme 100 à 120 compressions par minute

(Enfant : Compressions avec 1 main, Nourrisson : Compressions avec 2 doigts)

2 insufflations :

lentes et progressives jusqu'au soulèvement de la poitrine

(Nourrisson : Insufflations bouche/bouche-nez)

- ◆ **Le défibrillateur** Le poser dès son arrivée Allumer et suivre les instructions Attention : sol mouillé

Electrodes enfant ou nourrisson si possible

- ◆ Poursuivre RCP jusqu'à reprise de la **respiration** ou prise en charge par les **secours**