hormone de bouturage

L'HORMONE DE BOUTURAGE favorise l'émission et la croissance des racines des boutures. Elle accroît le pourcentage de réussite du bouturage, notamment en cas de reprise lente et irrégulière. Elle est utilisée sur arbres et arbustes d'ornement (conifère, rosier, hortensia, etc...), plantes florales (pélargonium, chrysanthème, œillet) et d'appartement.

Ce produit favorise en outre l'apparition des racines sur bulbes et semences, assurant une levée plus rapide et homogène.



MODE D'EMPLOI

• Bouturage des plantes ligneuses et semi-ligneuses:

– humidifier la base des boutures;

– tremper ces dernières dans HORMONE DE BOUTURAGE sur 2 à 3 cm;

– enlever l'excès de poudre en secouant légèrement les boutures ou en les tapotant sur le bord d'un récipient;

– mettre en place les boutures de la façon habituelle dans les trous de plantation préalablement préparés en évitant de faire tomber le produit.

Seule la base humidifiée des boutures doit être imprégnée de poudre.

• Bulbes et semences:

– saupoudrer les bulbes et les semences avec HORMONE DE BOUTURAGE dans un récipient et agiter;

– récuperer l'excès de produit en tamisant;

– semer de façon habituelle en évitant d'enlever la poudre.

ÉPOQUE D'EMPLOI

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D